




Nutrition Entérale

Fresubin® HP Energy Fibre

Nutrition complète par sonde **hypercalorique hyperprotéinée** avec fibres pour les **besoins énergétiques accrus**.

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales (ADDFMS)*



Apport en Triglycérides à chaînes moyennes (TCM) :

- 57% de l'apport lipidique
- Source d'énergie rapidement disponible⁽¹⁾



Osmolarité proche de l'osmolarité physiologique (300 mOsm/l) :

Améliore la tolérance gastro-intestinale à la nutrition entérale⁽²⁾



EasyBag®, une poche unique® et innovante pour simplifier le quotidien.

- **Connexion rapide** : après ouverture trocarder directement sur la poche en suspension
- **Écoulement intégral du contenu** : forme entonnoir
- **Sans risque de fuite ou de contamination** : valve anti-reflux
- **Sécurité renforcée** : ailettes d'ouverture non repositionnables (témoin d'ouverture de la poche)
- **Gain de place** : 15 poches par carton (stockage optimisé) - une fois vide, la poche s'aplatit (réduction du volume des déchets)

Pour 500 ml :

- **750 kcal et 37,5 g de protéines**

- **Stérilisé**
- **Sans lactose, sans gluten**

- **Profil vitaminique et minéral complet***

- **Conditionnement** : Poche EasyBag® de 500 ml et 1000 ml

- **Conditionnement carton** : 500 ml : 15 poches/carton
1000 ml : 8 poches/carton

HPHC : Hyperprotéiné hypercalorique
TCM : Triglycérides à Chaînes Moyennes
* Arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux Aliments Diététiques Destinés à Des Fins Médicales Spéciales.
© à ce jour 23/03/2018.

Fresubin® HP Energy Fibre

Par poche de 500 ml et 1000 ml



Informations nutritionnelles

Analyse moyenne		pour 100 ml	par unité 500 ml
ÉNERGIE	kcal (kJ)	150 (630)	750 (3150)
LIPIDES (35% AET)	g	5,8	29
dont A.G. Saturés	g	3,7	18,5
dont TCM	g	3,3	16,5
dont A.G. Monoinsaturés	g	0,5	2,5
dont A.G. Polyinsaturés	g	1,5	7,5
dont acide linoléique	g	1,21	6,05
dont acide alpha-linolénique	g	0,13	0,65
dont EPA - DHA	g	0,05	0,25
Rapport ω6/ω3		6	
GLUCIDES (43% AET)	g	16,2	81
dont Mono et disaccharides	g	1,11	5,55
dont lactose	g	≤ 0,06	≤ 0,3
dont Maltodextrines	g	15,09	75,45
FIBRES (2% AET)	g	1,5	7,5
PROTÉINES (20% AET)	g	7,5	37,5
Sel	g	0,24	1,20
Teneur en eau	ml	79	395
Osmolarité	mosmol/l	360	
MINÉRAUX			
Sodium	mg	95	475
Potassium	mg	234	1170
Chlorures	mg	184	920
Calcium	mg	80	400
Magnésium	mg	27	135
Phosphore	mg	63	315
Fer	mg	1,33	6,65
Zinc	mg	1,2	6
Cuivre	µg	130	650
Manganèse	mg	0,27	1,35
Iode	µg	13,3	66,5
Fluor	mg	0,13	0,65
Chrome	µg	6,7	33,5
Molybdène	µg	10	50
Sélénium	µg	6,7	33,5
VITAMINES			
A	µg RE	92	460
Dont β-carotène	µg RE	22	110
D3	µg	1,33	6,65
E	mg α-TE	1,33	6,65
K1	µg	6,67	33,35
Thiamine (B1)	mg	0,13	0,65
Riboflavine (B2)	mg	0,17	0,85
Niacine (PP)	mg (mg NE)	1,6 (4,1)	8 (20,5)
Pyridoxine (B6)	mg	0,16	0,8
Cyanocobalamine (B12)	µg	0,27	1,35
Acide pantothénique (B5)	mg	0,47	2,35
Biotine (B8)	µg	5	25
Acide folique (B9)	µg	27	135
C	mg	6,7	33,5
AUTRES COMPOSANTS			
Choline	mg	26,7	133,5
DONNÉES PHYSICOCHIMIQUES			
N/kcal totales		1/125	
N/kcal glucido lipidique		1/100	
EPA : acide eicosapentaénoïque - DHA : acide docosahexaénoïque. TCM : Triglycérides à Chaînes Moyennes - AET : Apports Énergétiques Totaux. - AG : Acides Gras			

Précautions d'utilisation

Utilisation

Conserver et administrer à température ambiante (15-25°C). Après ouverture, la poche connectée à la tubulure doit être utilisée dans les 24 heures. Administration par pompe ou par gravité. Agiter avant utilisation. Vérifier l'intégrité du conditionnement et l'aspect du produit. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments ou d'autres nutriments dans le produit. Peut présenter une sédimentation de minéraux et/ou de fibres insolubles, de couleur plus ou moins foncée. Ces sédiments peuvent être facilement dissous en agitant la poche. Ceci n'affecte ni la composition ni les qualités microbiologiques et nutritionnelles du produit.

Avis important

A utiliser sous contrôle médical. Contrôler le débit d'administration. Augmenter lentement le débit en début de réalimentation. Aliment complet pouvant être utilisé comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique adapté. Usage entéral exclusif. Ne pas utiliser par voie parentérale (I.V.). Stérilisé.

Ingrédients

Eau, maltodextrines, protéines de lait, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soja, inuline de chicorée, cellulose, citrate de potassium, dextrine de blé, huile de poisson, chlorure de potassium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, vit. C, chlorure de choline, citrate de sodium, oxyde de magnésium, phosphate de calcium, correcteur d'acidité (E 330), citrate de magnésium, émulsifiant (E 471), fluorure de sodium, pyrophosphate de fer, sulfate de fer, niacine, vit. E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, iodure de potassium, vit. B2, sulfate de cuivre, vit. B6, vit. B1, vit. A, β-carotène, acide folique, molybdate de sodium, sulfate de zinc, chlorure de chrome, sélénite de sodium, biotine, vit. K1, vit. D3, vit. B12.

Les ingrédients allergènes sont soulignés dans la liste d'ingrédients conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires en vigueur. (Règlement information du consommateur n°1169-2011 du 25 octobre 2011).

Données logistiques

Fresubin® HP Energy Fibre	Réf.	Code GTIN	Code LPPR*	Quantité/ Carton	Péremption mois
EasyBag® 500 ml	7987221	40 51895 00374 0	1192007	15	12
EasyBag® 1000 ml	7987231	40 51895 00378 8	1124690	8	12

* Liste des Produits et Prestations Remboursables selon l'Arrêté du 19 février 2010 rectifiant l'Arrêté du 09 novembre 2009, Avis de fixation des prix associés (J.O. du 11/10/2013) et Arrêté du 14 décembre 2015 fixant les nouvelles durées d'inscription (J.O. du 16 décembre 2015).

1. Sandström R et al. Structured triglycerides were well tolerated and induced increased whole body fat oxidation compared with long chain triglycerides in postoperative patients. JPEN 1995 ; 19(5) : 381-6. 2. Standards, Options et Recommandations (SOR). Bonnes pratiques pour la prise en charge diététique en cancérologie : la nutrition entérale. Avril 2005.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life*

*Prendre soin de la vie

Distribué par :
Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
265, rue de la Découverte - Bât B
CS 47667 - 31676 Labège
www.fresenius-kabi.fr

Fresenius Kabi AG - 61346
Bad Homburg, Allemagne



Les emballages de nos produits peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr



INFORMATIONS PRODUITS

0 800 470 044

Service & appel gratuits

SERVICE COMMANDES

N°Cristal 09 69 39 97 97

appel non surtaxé